

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

#### 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não existem relatos de reações adversas na utilização de STODAL.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

#### 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não existem relatos de casos de superdosagem durante a utilização do medicamento STODAL.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

#### DIZERES LEGAIS

MS - 1.6916.0003.001-3

#### Farmacêutica Responsável:

Dra. Thaise de Siqueira Dal Mas Dias

CRF-SP no. 90.975

#### Fabricado por:

**BOIRON S.A.**

2, avenue de l'Ouest lyonnais

69510 Messimy - FRANÇA

Registrado, importado e Distribuído por:

**BOIRON MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS LTDA**

Rua Joaquim Floriano,

1120 conj. 41 - 04534-000

São Paulo - S.P. CNPJ

07.498.711/0001-87

www.boiron.com.br

Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 20/02/2019.



### *Drosera 3 CH + Associação* **MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO**

#### APRESENTAÇÕES

STODAL xarope, em frasco de vidro de 150 ml.

#### USO ORAL

#### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

#### COMPOSIÇÃO

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| <i>Drosera 3 CH</i> .....              | 10 ml  |
| <i>Arnica montana 3 CH</i> .....       | 10 ml  |
| <i>Belladonna 3 CH</i> .....           | 10 ml  |
| <i>Cina 3 CH</i> .....                 | 10 ml  |
| <i>Coccus cacti 3 CH</i> .....         | 10 ml  |
| <i>Corallium rubrum 3 CH</i> .....     | 10 ml  |
| <i>Cuprum 3 CH</i> .....               | 10 ml  |
| <i>Ferrum phosphoricum 3 CH</i> .....  | 10 ml  |
| <i>Ipeca 3 CH</i> .....                | 10 ml  |
| <i>Solidago virga aurea 1 CH</i> ..... | 10 ml  |
| Excipientes q.s.p .....                | 100 ml |

Excipientes: benzoato de sódio, ácido cítrico monohidratado, solução de sacarose e água purificada.

#### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

##### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

STODAL é indicado como auxiliar no tratamento da tosse seca ou produtiva; por promover o alívio da irritação da garganta ou por diminuir a viscosidade das secreções facilitando a expectoração.

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

##### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas

conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

As substâncias utilizadas na fabricação dos medicamentos homeopáticos são experimentadas em indivíduos sadios e desenvolvem determinados sinais e sintomas que revelam seu potencial medicamentoso. A preparação em doses mínimas dos medicamentos homeopáticos, a partir dessas substâncias, objetiva a ação inversa à provocada na experimentação.

A Homeopatia está baseada na Lei da cura que afirma: “O semelhante pode curar o semelhante”. Assim, as substâncias que provocam estes sintomas da tosse, são utilizadas em doses homeopáticas para auxiliar o tratamento deste distúrbio.

A ação do medicamento homeopático é imediata, as doses devem ser repetidas até o desaparecimento completo dos sintomas.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve utilizar este produto se tiver hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula.

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Até o momento, não são conhecidas informações sobre relatos de interações de STODAL com outros medicamentos ou alimentos.**

**Atenção diabéticos:** Este medicamento contém SACAROSE (Açúcar).

Este medicamento contém:

- 2,1 g de sacarose por dose de 2,5 ml;
- 4,2 g de sacarose por dose de 5 ml;
- 12,6 g de sacarose por dose de 15 ml.

Consulte seu médico caso você tenha doença crônica dos brônquios ou dos pulmões.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve armazenar **STODAL** em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e da umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Solução límpida de coloração amarelo claro.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

**Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletro magnética, como por exemplo: forno de microondas, aparelho celular, televisão, etc.**

### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Posologia sugerida:

Você deve utilizar o copo-medida nas doses indicadas abaixo:

Adultos: você deve tomar, por via oral, 1 dose de 15 ml 2 a 3 vezes ao dia.

Crianças maiores de 5 anos: você deve administrar à criança, por via oral, 1 dose de 5 ml 2 a 3 vezes ao dia.

Crianças menores de 5 anos: você deve administrar à criança, por via oral, 1 dose de 2,5 ml 2 a 3 vezes ao dia.

No caso de adultos, não utilizar mais que 45 ml por dia.

No caso de crianças maiores que 5 anos, não utilizar mais que 15 ml por dia.

No caso de crianças menores que 5 anos, não utilizar mais que 7,5 ml por dia.

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 5 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.**

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.**

**O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar os sintomas. Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

### 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você pode administrar **STODAL** assim que se lembrar. Não exceda a dose recomendada para cada dia.